

БУЗ РА «Кожно-венерологический диспансер»		СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА	Номер: 16 Лист: 1 Всего: 4
НАЗВАНИЕ: <b>Надевание и снятие нестерильных перчаток</b>			Подразделение: все подразделения
Действует с «    » 2020г.	Заменяет: Вводится впервые	Причина пересмотра:	Дата следующего пересмотра:
Составил: заведующая КДО Яценко М.В., врач-эпидемиолог Чекурова О.А.		УТВЕРДИЛ: Главный врач БУЗ РА «Кожно-венерологический диспансер» Арбакова Д.Т. «28» июля 2020 г.	

**Цель:** Стандартизовать методику надевания и снятия нестерильных перчаток с целью защиты рук медицинского персонала и создания барьера между пациентом и медицинскими работниками при выполнении ими профессиональных обязанностей.

**Область применения**

Где: все подразделения БУЗ РА «Кожно-венерологический диспансер».

Когда: постоянно.

Ответственность: весь медицинский персонал БУЗ РА «Кожно-венерологический диспансер» персонально.

Контроль: заведующая подразделением, старшая медицинская сестра, главная медицинская сестра. Выборочный контроль выполнения протокола осуществляет врач-эпидемиолог.

**Основная часть**

1. Применение перчаток не является заменой обеззараживанию рук кожными антисептиками.
2. Правильное применение медицинских перчаток обеспечивает защиту рук медицинских работников.
3. Запрещено использование одной и той же пары одноразовых перчаток при проведении медицинских манипуляций нескольким пациентам, а также при выполнении медицинских манипуляций у одного пациента, но в различных анатомических областях, отличающихся по составу микрофлоры.
4. Нестерильные перчатки необходимо использовать в случаях риска контакта медицинских работников с кровью, другими биологическими жидкостями, поврежденной кожей и слизистой, с медицинскими изделиями загрязненными биологическими жидкостями организма.
5. Нестерильные перчатки всегда следует использовать в качестве мер стандартной предосторожности при работе с пациентами, инфицированными и/или колонизированными резистентными микроорганизмами (грамотрицательные бактерии резистентные к 3 и более классам антибиотиков, резистентные к карбапенемам, метициллинрезистентный стафилококк, ванкомицинрезистентный энтерококк), а также пациентами с псевдомембранозным колитом, вызванным *Clostridium difficile*, и лицами, инфицированными вирусами-возбудителями гемоконтактных инфекций (ВГВ, ВГС, ВИЧ и др.).
6. Перчатки можно не использовать в ситуациях контакта с неповрежденной кожей, с предметами окружающей обстановки.
7. Перчатки во время выполнения манипуляций не рекомендуется обрабатывать антисептическими и дезинфицирующими средствами, так как это отрицательно влияет на их герметичность и может привести к усилению проницаемости.



8. Перчатки следует заменить в следующих ситуациях:
  - после повреждения (прокола); после обнаружения дефекта;
  - после случайного электрического удара от электрохирургического инструмента;
  - при попадании (впитывания) под перчатку любой жидкости;
  - при появлении липкости;
  - при ощущении появления "перчаточного сока";
  - при переходе от "грязного" этапа операции к "чистому".
9. Если повредилась одна перчатка, необходимо заменить обе.
10. При замене перчаток после снятия их с рук следует провести обработку рук кожным антисептиком. Новую пару перчаток надевать на высохшие руки.

#### **Техника проведения:**


- снять кольца с пальцев рук;
  - провести обработку рук СОП «Порядок проведения гигиенической обработки рук при оказании медпомощи» от ;
  - вначале перчатка надевается на доминантную (правую) руку;
  - необходимо прикасаться только к той части перчатки, которая будет находиться на запястье (верхний край манжеты);
  - надеть первую перчатку, большим и указательным пальцами левой руки захватывая край манжеты правой перчатки;
  - достать вторую перчатку рукой без перчатки и прикасаться к той части перчатки, которая будет находиться на запястье;
  - чтобы избежать прикосновения руки с надетой перчаткой к коже предплечья, необходимо вывернуть наружную поверхность перчатки так, чтобы надеть ее на согнутые пальцы руки перчатке, это позволит надеть вторую перчатку (Рис.1).
- После того, как перчатки надеты, нельзя прикасаться к любым объектам внешней среды контакт с которыми является показанием для смены перчаток.**

- провести запланированную процедуру в перчатках;
- взять пальцами правой руки в перчатке манжету на левой перчатке с наружной стороны, сделать отворот;
- по той же схеме сделать левой рукой отворот на правой перчатке;
- снять перчатку с левой руки, выворачивая ее наизнанку и оставить ее, держа за отворот, в правой руке;
- левой рукой снять перчатку с правой руки, выворачивая ее наизнанку и погружая в нее перчатку с левой руки;
- погрузить обе перчатки в емкость с дезинфицирующим раствором для обеззараживания или в одноразовую емкость для временного хранения отходов класса Б с целью последующего централизованного обеззараживания/обезвреживания (Рис.2);
- провести гигиеническую обработку рук.







**Рис. 1 Порядок надевания нестерильных перчаток.**




1. Достаньте перчатку из упаковки (коробки).




2. Прикасайтесь только к той части перчатки, которая будет находиться на запястье (верхний край манжеты).




3. Наденьте первую перчатку.



4. Возьмите вторую перчатку рукой без перчатки и прикасайтесь к той части перчатки, которая будет находиться на запястье.




5. Чтобы избежать прикосновения руки с надетой перчаткой к коже предплечья, выверните наружную поверхность перчатки так, чтобы надеть ее на согнутые пальцы руки в перчатке, это позволит вам надеть вторую перчатку.




6. После того, как перчатки надеты, нельзя прикасаться к любым объектам внешней среды, контакт с которыми является показанием для смены перчаток.


**Рис. 2 Порядок снятия нестерильных перчаток.**



1. Взять пальцами правой руки в перчатке манжету на левой перчатке с наружной стороны, сделать отворот. По той же схеме сделать левой рукой отворот на правой перчатке



2. Снять перчатку с левой руки, выворачивая ее наизнанку и оставить ее, держа за отворот, в правой руке



3.левой рукой снять перчатку с правой руки, выворачивая ее наизнанку и погружая в нее перчатку с левой руки  
Утилизировать использованные перчатки в отходы класса Б



### Нормативно-справочная документация

1. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
2. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
3. Федеральные клинические рекомендации «Гигиена рук медицинского персонала». Национальная ассоциация специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (НАСКИ).
4. МР 3.5.1.0113-16 Использование перчаток для профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в медицинских организациях

Эксперты:

главная медицинская сестра, Арланова О.Н.

старшая медицинская сестра, Ситникова Т.Г.











### Распределение инструкции

Экземпляр Подразделение

Оригинал главная медицинская сестра

Ответственные исполнители ознакомлены и обязуются исполнять:

№ п/п	Фамилия	Подпись	Дата
1.	Арланова О.Н.		
2.	Ситникова Т.Г.		
3.	Ситникова Т.Г.		
4.	Ситникова Т.Г.		
5.	Ситникова Т.Г.		
6.	Ситникова Т.Г.		
7.	Ситникова Т.Г.		
8.	Ситникова Т.Г.		
9.	Ситникова Т.Г.	